



CARACTERÍSTICAS DE LAS HOJAS

TIPO




simple




compuesta


MARGEN



entero




aserrado




lobulado

FILOTAXIA



alterna




opuesta

Paseos botánicos

Especies nativas



Parque Quinta Normal



Laboratorio
F l o r e s



Cryptocarya alba


Lauraceae

“PEUMO”



Uso: su fruto sirve de alimento a diversas aves (ej. Zorzales) y se usa para elaborar aceites esenciales.

Propagación: Quitar por completo la “carne” roja del fruto antes de sembrar



Hojas aromáticas (sobre todo al quebrarlas)
levemente lobuladas dando impresión ondulada



Quillaja saponaria


Quillajaceae

“QUILLAY”



Uso: su corteza se usa como detergente/shampoo debido a sus saponinas, de las que cada día se descubren nuevos usos.

Propagación: sembrar directamente en tierra.



Hojas NO aromáticas, levemente lobuladas y puntiagudas



Kageneckia oblonga


Rosaceae

“BOLLÉN”



Uso: como laxante y control de vómito

Propagación: sembrar directamente en tierra.



Hojas aserradas (dientes pequeños y puntiagudos) y duras



Beilschmiedia miersii


Lauraceae

“BELLOTO DEL NORTE”



Uso: madera de muy buena calidad. Su fruto se usa para alimentar cerdos en el campo (en la foto se ve la semilla, no el fruto).

Propagación: sembrar directamente en tierra.



Hojas con margen entero a ondulado,
opuestas levemente desfasadas



Colliguaja odorifera


Euphorbiaceae

“COLLIGUAY”



Uso: Corteza y ramas contienen látex. En medicina popular se usa para el dolor de muelas

Propagación: dejar semillas en remojo durante 3 días antes de sembrar.



Al cortar la rama sale una sustancia blanquecina (látex)



Maytenus boaria


Celastraceae

“MAITÉN”



Uso: Su leña se usa como carbón vegetal y sus hojas son usadas para alimentar ganado.

Propagación: retirar “carne” roja del fruto antes de sembrar



Hojas generalmente alargadas




Retanilla trinervia

Rhamnaceae

“TEVO”



Usos: Se usaba la corteza para curar heridas de quemaduras y en infusiones para curar abscesos provocados por golpes.



La hoja se caracteriza por tener tres nervios particularmente marcados




Cestrum parqui

Solanaceae

“PALQUI”



Usos: Toda la planta es tóxica, tallos, hojas, bayas y aún las raíces parcialmente enterradas.




La hoja emite un olor “desagradable”
parecido a la goma cuando son
machacadas



Azara sp.

Salicaceae

El género *Azara* tiene la particularidad de presentar estípulas muy marcadas: se ven como una hojita extra pequeña en la base de cada hoja



“CORCOLÉN BLANCO”



A. dentata

Hoja con dientes muy marcados

“LILÉN”



A. celsastrina

Hoja con dientes leves,
margen casi ondulado



Jubaea chilensis

Celastraceae

“PALMA CHILENA”



Uso: Sus coquitos son aptos para el consumo humano y de ellos se extrae el aceite de palma.
Su tronco es de **corteza lisa**.

Propagación: pasar lija por superficie antes de sembrar en tierra. Demora mucho tiempo en germinar (+6 meses)

Hojas en forma de pluma, en cada división de la pluma es cóncava (con el vértice hacia arriba, como el techo de una casa). Es una de las principales diferencias con palmas introducidas, donde estas son convexas (con el vértice hacia abajo)